

I sposób - preparat FORTRANS

Najlepiej na 3 dni przed badaniem zastosować dietę półpłynną bez owoców pestkowych (winogron, kiwi, truskawki), pomidorów, maku.

Badanie rano:

W dniu poprzedzającym badanie można rano zjeść śniadanie do 8:00 (bez produktów mlecznych, surowych owoców i warzyw, pestek, potraw ciężkostrawnych, napojów gazowanych). W przypadku uporczywych zaparć można wykonać rano jednorazową lewatywę-preparat Rectanal.

W godzinach 12:00-14:00 należy wypić 2 saszetki Fortransu rozpuszczone w 2 litrach wody niegazowanej (smak roztworu można poprawić dodając sok z cytryny), następnie od godziny 16:00 do 18:00 należy wypić kolejne 2 saszetki Fortransu rozpuszczone w 2 litrach wody niegazowanej.

Przez cały dzień można pić wodę niegazowaną, ewentualnie herbatę.

W dniu badania należy nie jeść, nie pić.

Badanie po południu:

W dniu poprzedzającym badanie można jeść do 18:00 (bez produktów mlecznych, surowych owoców i warzyw, pestek, potraw ciężkostrawnych, napojów gazowanych). W przypadku uporczywych zaparć można wykonać jednorazową lewatywę-preparat Rectanal. Przez cały dzień poprzedzający badanie należy pić wodę niegazowaną, ewentualnie herbatę.

W dniu badania o godzinie 8:00- 10:00 należy wypić 2 saszetki Fortransu rozpuszczone w 2 litrach wody niegazowanej (smak roztworu można poprawić dodając sok z cytryny i schłodzić). Następnie 6 godzin przed badaniem należy wypić kolejne 2 saszetki Fortransu rozpuszczone w 2 litrach wody niegazowanej, w ciągu 2 godzin.

W dniu badania można pić tylko wodę niegazowaną do 2 godzin przed badaniem.

W dniu badania:

1. Wolno przyjąć leki (poza przeciwcukrzycowymi) popijając je wodą.
2. Wolno pić klarowne płyny do dwóch godzin przed badaniem.
3. Należy przyjść z osobą towarzyszącą.
4. Po badaniu nie wolno prowadzić żadnych pojazdów mechanicznych.