

II sposób - preparat CITRA FLEET

Najlepiej na 3 dni przed badaniem zastosować dietę półpłynną bez owoców pestkowych (winogron, kiwi, truskawki), pomidorów, maku, surowych owoców i warzyw.

Badanie rano:

W dniu poprzedzającym badanie można rano zjeść śniadanie do 8:00 (bez produktów mlecznych, surowych owoców i warzyw, pestek, potraw ciężkostrawnych, napojów gazowanych). Przez cały dzień należy pić wodę niegazowaną, ewentualnie herbatę.

W przypadku uporczywych zaparć można wykonać rano jednorazową lewatywę- preparat Rectanal

O godzinie 14:00 należy wypić pierwszą porcję preparatu CitraFleet (zawartość saszetki rozpuścić w 150 ml wody), po czym należy wypić 2 litry wody niegazowanej.

Następnie 4 godziny przed badaniem należy spożyć drugą porcję preparatu, po czym należy wypić 2 litry wody niegazowanej.

W dniu badania należy nie jeść i nie pić.

Badanie po południu:

W dniu poprzedzającym badanie można jeść do 18:00 (bez produktów mlecznych, surowych owoców i warzyw, pestek, potraw ciężkostrawnych, napojów gazowanych). Przez cały dzień poprzedzający badanie należy pić wodę niegazowaną, ewentualnie herbatę.

W przypadku uporczywych zaparć można wykonać jednorazową lewatywę- preparat Rectanal

W dniu badania godzinie 8:00 rano należy wypić pierwszą porcję (1 saszetka) preparatu CitraFleet (zawartość saszetki rozpuścić w 150 ml wody), po czym należy wypić 2 litry wody niegazowanej.

Następnie o godzinie 6:00 należy spożyć drugą porcję preparatu, po czym należy wypić 2 litry wody niegazowanej.

W dniu badania można pić tylko wodę niegazowaną do 2 godzin przed badaniem.

W dniu badania:

1. Wolno przyjąć leki (poza przeciwcukrzycowymi) popijając je wodą.
2. Wolno pić klarowne płyny do dwóch godzin przed badaniem.
3. Należy przyjść z osobą towarzyszącą.
4. Po badaniu nie wolno prowadzić żadnych pojazdów mechanicznych.